

BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KEMATIAN PERINATAL DI KABUPATEN KULON PROGO

Oleh: Suparjono -- E2A2A201079
(2003 - Skripsi)

Kematian bayi merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi sangat dipengaruhi oleh angka kematian perinatal. Di Kabupaten Kulon Progo angka kematian perinatal mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu sebesar 8,98 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 19,17 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2002. Salah satu upaya untuk mencegah atau menekan angka kematian perinatal adalah dengan menemukan faktor risiko sedini mungkin dan menanganinya secara intensif selama kehamilan, persalinan dan masa nifas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang ada hubungannya dengan kejadian kematian perinatal.

Jenis penelitian ini adalah Eksplanatori dengan pendekatan kasus kontrol. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Populasi dan sampel yang diambil sebesar 65 kasus dan 65 kontrol. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik Khai Kuadrat tingkat kemaknaan 0,05 dengan menggunakan bantuan komputer program Epi Info 2000.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kematian perinatal sebesar 52,3% terdapat pada ibu dengan bukan umur reproduksi sehat, 67,7% dengan tingkat pendidikan dasar dan 53,8 % dengan perawatan antenatal tidak memenuhi K4 standard. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kematian perinatal adalah umur ibu (p value=0,004; OR=3,97), pendidikan ibu (p value=0,013; OR=2,6) dan perawatan antenatal (p value = 0,004; OR=3,046).

Disarankan bagi pengelola program KIA untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kematian perinatal, bagi ibu hamil agar melakukan perawatan antenatal yang memenuhi standar K4 serta bagi pasangan usia subur agar dapat merencanakan kehamilan pada umur reproduksi sehat, pada waktu hamil agar melakukan ANC yang memenuhi standar serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.

Kata Kunci: Perinatal, Faktor Risiko, Kulon Progo

THE FACTORS RELATED TO PERINATAL DEATH ACCURANCE IN KULON PROGO DISTRICT

Abstract

Perinatal Mortality Rate (PMR) in Kulon Progo District is still high. In Kulon Progo PMR has sharply increase from 8,96 per 1000 live birth in 2001 to 19,17 per 1000 live birth in 2002. One way preventing and reducing the Perinatal Mortality Rate by becoming aware of risk factor as soon as possible and intensively handling these during pregnancy and labour.

This research was used to find some factors related to perinatal death occurrence. This research employed an explanatory research type together with case control study research design. This research location in Kulon Progo District with 65 perinatal death cases as samples and 65 samples as a control. Data had been analyzed by Chi Square statistic test with significance 0,05 by using Epi Info 2000 computer program.

These research show that 52,3% of perinatal death incidences occur with unhealthy mothers, 67,7% with basic education level and 53,8% with antenatal curing not fulfilled to standard.

There suggestion for the managers of mother and children health programs to be aware of mother age perinatal death factors, education level and antenatal care in the next plan and activity program, while the pregnant mother should be take part in perinatal curing which fulfills K4 standard and for fertile couple to consider age risk factor, antenatal curing, parity condition and labour helping in planning pregnancy and labour.

Keyword : Perinatal, Risk Factor, Kulon Progo